


# แนวทางการวินิจฉัยโรคเบาหวาน



การเริ่มรักษาด้วยยา  
Metformin [500] 1\*1 pc ขนาดสูงสุด 2\*2  
ปรับยาทุก 2-3 เดือน

MAX. สด ไม่เกิน 2500 mg/day.

ถ้า FBS ไม่ได้ตามเป้าหมาย ให้ปรับเพิ่มยา  
Glipizide [5] 1\*1 oral ac ขนาดสูงสุด 2\*2  
ปรับยาทุก 2-3 เดือน

โทรปรึกษาแพทย์ 053-781342-3  
OPD ต่อ 109  
ER ต่อ 105  
Line group: CM เวียงใจดี

ถ้าไม่สามารถควบคุมโรคได้ คือ

1. FBS > 160 mg% ติดต่อกัน 3 ครั้ง
2. HbA1c > 9 %
3. ได้รับความดันโลหิต 3 ตัวขึ้นไป และ  
BP > 140/90 mmHg ติดต่อกัน 3 ครั้ง
4. Cr > 1.5 หรือ GFR < 60

**\*\*หมายเหตุ**

- ไม่ควรให้ยา Metformin ในผู้ป่วยที่  
Cr > 1.5 หรือ GFR < 60
- ไม่ควรให้ยา Glipizide ในผู้ป่วยที่  
Cr > 2.0 หรือ GFR < 30

ส่งพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

ปรับยาแล้ว ๖-๘ สัปดาห์ จ.เห็นความเปลี่ยนแปลง

## แนวทางการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

