

ใบประกอบการสั่งใช้ยา Atorvastatin 40 mg Tablet

ชื่อผู้ป่วย อายุ ปี HN
วันที่..... eGFR = ml/min/1.73m² สิทธิการรักษา

วิธีการใช้ยา Atorvastatin 40 mg เม็ด วันละ 1 ครั้ง ก่อนนอน
หมายเหตุ ผู้ป่วย eGFR <45 หรือปลุกถ่ายไต ควรเริ่มที่ 20 mg x hs

เหตุผลในการพิจารณาใช้ยา

- ไข้กับผู้ป่วยที่ไข้ยา simvastatin ขนาด 40 mg ติดต่อกัน 6 เดือน แล้วยังไม่สามารถควบคุมระดับ LDL-C ได้ถึงค่าเป้าหมาย
- ไข้กับผู้ป่วยที่เกิดผลข้างเคียงจากยา simvastatin ได้แก่ มีค่า alanine aminotransferase (ALT) เพิ่มขึ้น 3 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ หรือค่า Creatine phosphokinase (CPK) เพิ่มขึ้น > 5 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ
- ผู้ป่วย high risk stroke หรือ MI มีความจำเป็นต้องได้รับ high-intensity statin
- อื่นๆ

แพทย์ผู้สั่งใช้ /

สำหรับเภสัชกร

พิจารณาในเบื้องต้นแล้วพบว่า เข้าเกณฑ์ ไม่เข้าเกณฑ์.....

ลงชื่อ.....เภสัชกร

สรุปผลการประเมินการใช้ยา Atorvastatin โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

ระยะเวลาการเก็บข้อมูล : ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

ผู้ป่วยที่เริ่มใช้ยา Atorvastatin ที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้าในช่วงที่เก็บข้อมูล จำนวน 92 ราย

แนบใบ DUE ประกอบการสั่งใช้ยา จำนวน 85 ราย คิดเป็นร้อยละ 92.39

ตารางแสดงเหตุผลในการใช้ยา Atorvastatin

เหตุผลในการใช้ยา Atorvastatin	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	ร้อยละ
ใช้กับผู้ป่วยที่ใช้ยา simvastatin ขนาด 40 mg ติดต่อกัน 6 เดือน แล้วยังไม่สามารถควบคุมระดับ LDL-C ได้ถึงค่าเป้าหมาย	17	20
ใช้กับผู้ป่วยที่เกิดผลข้างเคียงจากยา simvastatin ได้แก่ มีค่า alanine aminotransferase (ALT) เพิ่มขึ้น 3 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ หรือค่า Creatine phosphokinase (CPK) เพิ่มขึ้น > 5 เท่าของค่าสูงสุดของค่าปกติ	2	2.35
ผู้ป่วย high risk stroke หรือ MI มีความจำเป็นต้องได้รับ high-intensity statin	61	71.76
อื่นๆ	5	5.88
รวม	85	

สรุปผลการประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา Atorvastatin

- ผู้ป่วยใช้ยาเป็นไปตามเกณฑ์อย่างเหมาะสม จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 96.47
- ผู้ป่วยใช้ยาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.53